

BE PREPARED COUNTY OF SAN BERNARDINO!



Get your **FREE Flu Shot** and discover your **local community POD site**

A Point of Dispensing (POD) site is a location where the community can go to receive medication and or vaccinations during a public health emergency, such as a pandemic influenza or bioterrorism outbreak.

Name and Location	Date and Time
Hutton Community Center 660 Colton Avenue Colton, CA 92324	Monday, December 14, 2015 Clinic hours: 5:00 pm-7:00 pm
Wrightwood Elementary School 1175 Hwy 2 Wrightwood, CA 92397	Tuesday, December 15, 2015 Clinic hours: 5:00 pm-7:00 pm

For more information
contact the
Preparedness & Response
Program
at 909-252-4406

Vaccine Guidelines

Flu shot will be provided to:

Adults:

- Men, women, senior citizens and pregnant women

Children:

- 3 years and older
- A parent or guardian must accompany children under 18 years old
- Children under 9 years old, may require two (2) doses of flu vaccine (4 weeks apart) based on prior vaccination history

FluMist intranasal will be provided to:

- Healthy persons from 2 to 49 years of age, and not pregnant



¡ESTÉ PREPARADO CONDADO DE SAN BERNARDINO!



Reciba **GRATIS**, la Vacuna Contra la Gripe y descubra el **POD** en su comunidad local

Un sitio de Punto de Dispensación (POD) es un lugar donde la comunidad puede ir a recibir vacunas o medicamentos durante una emergencia de salud pública, tales como la influenza pandémica o el bioterrorismo

Name and Location	Date and Time
Hutton Community Center 660 Colton Avenue Colton, CA 92324	Lunes, 14 de Diciembre 2015 Horario de clínica: 5:00 pm-7:00 pm
Wrightwood Elementary School 1175 Hwy 2 Wrightwood, CA 92397	Martes, 15 de Diciembre 2015 Horario de clínica: 5:00 pm –7:00 pm

Para obtener más información, comuníquese con el Condado de San Bernardino Departamento de Salud Publica Programa de Preparación y Respuestas al 909-252-4406

Guía para la Vacuna

Vacuna contra la gripe se proporcionará a:

Adultos:

- Los hombres, las mujeres, los ancianos y las mujeres embarazadas

Niños:

- 3 años y mayores
- Un padre o tutor debe acompañar a los niños menores de 18 años
- Los niños menores de 9 años de edad, pueden requerir dos (2) dosis de la vacuna contra la gripe (4 semanas de diferencia) basado en la historia de vacunación previa

Vacuna intranasal FluMist se proporcionará a:

personas sanas 2-49 años de edad, y no están embarazadas

