

ZIKA: INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL VIRUS Y CÓMO PROTEGERSE




Acerca del zika

El virus del Zika se transmite a las personas, principalmente, a través de la picadura de un mosquito infectado de la especie *Aedes (Ae. aegypti y Ae. albopictus)*. Una persona con zika también puede transmitir la infección por vía sexual a sus parejas sexuales y una mujer embarazada puede transmitirla al feto. Las personas pueden protegerse de las picaduras de mosquitos y de contraer el zika por vía sexual. Esta hoja informativa explica quién se ve más afectado y por qué, los síntomas y el tratamiento, y cómo protegerse del zika.


Cómo se propaga el zika

Protéjase y proteja a su familia de las picaduras de mosquitos de día y de noche, ya sea dentro o fuera de su casa. Un mosquito se infecta cuando pica a una persona ya infectada con el virus. Ese mosquito puede propagar el virus al picar a otras personas.



El virus del Zika también se puede transmitir:

- Por vía sexual, al tener relaciones con una persona con zika.
- De una mujer embarazada al feto durante el embarazo o en fecha cercana al parto.
- A través de una transfusión de sangre (probable, pero no confirmado).



Síntomas del zika

Mucha gente infectada con zika no tiene síntomas o solo tiene síntomas leves. Los síntomas más comunes son fiebre, sarpullido, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, ojos enrojecidos y dolor muscular. Los síntomas pueden durar de unos días a una semana. Por lo general, el cuadro no es lo suficientemente grave como para ir al hospital, y es muy poco frecuente que se produzca la muerte a causa del zika. Una vez que una persona haya estado infectada con el zika, es muy probable que sea inmune a futuras infecciones.



Brote actual del zika

En la actualidad se están produciendo brotes del zika en muchos países y territorios. Los mosquitos que se pueden infectar y transmitir el zika viven en muchas regiones del mundo, incluidas algunas partes de los Estados Unidos.

Visite nuestra página web [Áreas con riesgo de zika](#) para informarse cuáles son las áreas con transmisión del zika.

espanol.cdc.gov/zika



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

Por qué se considera el zika un riesgo para algunas personas

La infección por el zika durante el embarazo puede provocar un defecto de nacimiento en el cerebro de los fetos, que se denomina microcefalia. Se han detectado otros problemas en fetos y bebés infectados con el virus del Zika antes de nacer, que incluyen defectos oculares, déficit auditivo y trastornos en el crecimiento. También aumentaron los informes de casos de síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad poco frecuente del sistema nervioso, en áreas afectadas por el zika.



Microcefalia



Cómo prevenir el zika

No existe vacuna para prevenir el zika. La mejor forma de prevenir enfermedades propagadas por mosquitos es protegerse y proteger a su familia de las picaduras de mosquitos. **Así es como debe hacerlo:**

- Use camisas de manga larga y pantalones largos.
- Permanezca en lugares con aire acondicionado y mallas en ventanas y puertas para evitar que entren los mosquitos.
- Tome medidas para controlar los mosquitos dentro y fuera de su casa.
- Trate su ropa y equipos con permethrina o compre artículos ya tratados.
- Use repelente de insectos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Siempre siga las instrucciones en la etiqueta del producto.
- Se ha demostrado que estos repelentes de insectos son eficaces y seguros, incluso para las mujeres embarazadas y las que están lactando, si se utilizan siguiendo las indicaciones.
- Los repelentes de insectos no se deben usar en bebés de menos de 2 meses de edad.
- Los productos que contienen aceite de eucalipto de limón o para-mentano-diol no se deben usar en niños menores de 3 años.
- Se pueden usar mosquiteros para cubrir a los bebés de menos de 2 meses cuando están en el portabebé, el cochecito o la cuna, para protegerlos de las picaduras de mosquitos.
- Dormir con mosquitero si las habitaciones no tienen aire acondicionado o mallas en las puertas y ventanas, o si duerme afuera.
- Use condón o absténgase de tener relaciones sexuales para prevenir la transmisión sexual del zika.

Qué hacer si tiene zika

No existe un medicamento específico para el zika. Trate los síntomas:

- Descanse bien.
- Tome líquido para evitar la deshidratación.
- Tome medicamentos como acetaminofeno para bajar la fiebre y aliviar el dolor.
- No tomar aspirina ni otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos.
- Si está tomando medicamentos para otra afección, hable con su proveedor de atención médica antes de tomar otros medicamentos.

Para evitar que otras personas se enfermen, cumpla estrictamente las medidas para evitar las picaduras de mosquitos durante la primera semana de la enfermedad.



espanol.cdc.gov/zika/